


# Después de Aplicarte la Vacuna Contra el COVID-19



Después de que reciba la vacuna, se le pedirá que permanezca en la clínica durante 15 o 30 minutos. Esto es para asegurarse de que no sufra una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas no son comunes. El personal médico que administra las vacunas sabe cómo tratar las reacciones alérgicas.

**Avísele al personal médico** si es que observa sarpullido, hinchazón de la cara o la boca, problemas para respirar y/o si se siente mal

Es posible que después de recibir la vacuna, experimente algunos efectos secundarios leves. Estos deberán desaparecer en unos cuantos días. Los efectos secundarios más comunes pueden ser:

- dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor muscular o en las articulaciones
- un poco de fiebre, o escalofríos
- ganglios linfáticos inflamados (poco común)
- diarrea
- náuseas/vómitos



Los efectos secundarios graves después de recibir la vacuna son muy poco frecuentes. Sin embargo, si usted desarrolla cualquiera de las siguientes reacciones adversas dentro de los tres siguientes días después de recibir la vacuna, busque atención médica de inmediato o llame al 911 si es que se siente muy mal.

**Estas reacciones pueden ser:**

- sarpullido
- hinchazón de la cara o la boca
- dificultad para respirar
- fiebre alta (más de 40°C)
- convulsiones
- color muy pálido y somnolencia aguda. Otros síntomas graves (por ejemplo, hormigueo o adormecimiento)

**Para llamar al 911:** Marque desde cualquier teléfono, si no habla inglés, pida hablar en su idioma.

Para obtener más información, visite: [ontario.ca/covidvaccine](https://ontario.ca/covidvaccine)